Liste de Coquilles marines recueillies par M. E. Aubert de la Rüe à la Côte d'Ivoire (1926),

par M. Ed. Lamy.

M. Edg. Aubert de la Rüe, Attaché au Service géologique du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, a recueilli en 1926 sur les plages de la Côte d'Ivoire une petite série de Coquilles marines : les Gastropodes y sont peu nombreux; les Pélécypodes plus abondants renferment, à côté d'espèces bien connues, quelques formes intéressantes, parmi lesquelles il faut mentionner notamment deux Tellines qui n'étaient pas encore représentées dans les collections du Muséum national de Paris.

Gastéropodes.

Siphonaria algesiræ Quoy et Gaimard = *Lepas mouret* Adanson. — Plage entre Tabou et San Pedro.

Terebra micans Hinds = *T. arvan* Adanson. — Assinie.

Oliva (Olivancillaria) acuminata Lamarck. — Id.

Purpura (Stramonita) hæmastoma Linné = P. sakem Adanson. — Plage entre Tabou et San Pedro.

Cypræa stercoraria Linné = *C. majet* Adanson (*pars*). — Drewin.

Potamides (Tympanotomus) fuscatus Linné var. radula Linné = *C rithium popel* Adanson. — Plage entre Tabou et San Pedro.

Janthina planispirata A. Adams et Reeve. — Id.

Sigaretus bifasciatus Récluz. — Id.

Nerita senegalensis Gmelin = *N. dunar* Adanson. — Id.

Haliotis rosacea Reeve var. striata Reeve = *H. ormier* Adanson. — Id.

Fissurella nubecula Linné. — Id.

Patella Adansoni Dunker = *Lepas libot* Adanson. — Id.

Pélécypodes.

Ostrea gasar Adanson = *O. parasitica* var. β Gmelin. — Plage entre Tabou et San Pedro.

Pecten orbicularis Sowerby = *Perna essan* Adanson. — Grand-Bassam.

Mytilus perna Linné = *M. pictus* Born = *M. africanus* Chemnitz = *M. afer* Gmelin. — Plage entre Tabou et San Pedro.

Arca (Anadara) senegalensis Gmelin = *Pectunculus robet* Adanson. — Tabou, San Pedro, Grand-Bassam. — Je rapporte à cette espèce plusieurs valves isolées d'une petite Arche, présentant 25-26 côtes, qui, par son aspect général, me paraît correspondre assez bien à la coquille d'Adanson : ce *P. robet* ne peut pas être comme l'avait suggéré Nyst (1847, *Mém. Acad. R. Belgique*, XXII, p. 68), l'*A. obliqua* Reeve (1844, *Conch. Icon.*, pl. VI, fig. 41), qui possède 35-36 côtes, dont les antérieures présentent un sillon.

Arca (Senilia) senilis Linné = *Pectunculus fagan* Adanson. — Tabou, San Pedro, Grand-Bassam.

Pectunculus vovan Adanson = *P. stellatus* (*pars*) Gmelin. — Id. — J'ai adopté pour cette espèce le nom de *P. vovan*, car la définition du *P. stellatus* Gm. est si insuffisamment précise qu'il a pu être identifié au jeune du *P. violacescens* Lk. tout aussi bien qu'à une variété du *P. glycymeris* L. (1911, Lamy, *Journ. de Conchyl.*, LIX, p. 146).

Venericardia (Cardiocardita) ajar Adanson [*Chama*]. — Plage entre Tabou et San Pedro.

Crassatella (Crassatina) contraria Gmelin = *Venus divaricata guinaica* Chemnitz. — Id.

Cardium (Tropidocardium) costatum Linné = *Pectunculus kaman* Adanson. — Assinie.

Cardium (Ringicardium) ringens (Chemnitz) Gmelin = *Pectunculus mofat* Adanson. — Tabou, San Pedro, Grand-Bassam, Assinie.

Dosinia africana Gray = *Chama dosin* Adanson = *Cytherea Adansoni* Philippi. — Plage entre Tabou et San Pedro.

Dosinia isocardia Dunker. — Id.

Meretrix (Pitaria) tumens Gmelin = *Chama pitar* Adanson. — Tabou, San Pedro, Grand-Bassam.

Meretrix (Tivela) tripla Linné = *Tellina tivel* Adanson. — Tabou, San Pedro, Grand-Bassam, Assinie.

Ungulina alba Rang. — Plage entre Tabou et San Pedro.

Donax (Chion) rugosus Linné = *Tellina pamet* Adanson = *D. elongatus* Lamarck. — Tabou, San Pedro, Grand-Bassam, Assinie.

Mactra glabrata Linné (*non* Gmelin) = *Chama lisor* Adanson = *M. Adansoni* Philippi. — Tabou, San Pedro, Grand-Bassam.

Mactra nitida Spengler. — Id.

Corbula procera Hinds. — Lagune Tendo. — Je rapporte à cette espèce, dont Hinds (1844, *P. Z. S. L.*, p. 26) n'indique pas l'habitat,

plusieurs exemplaires d'une Corbule qui peut atteindre 20 mm. de longueur (taille supérieure à celle du *C. trigona* Hds. du Sénégal) et qui est identique à des spécimens de la Casamance déterminés *C. procera* dans la collection du Dr Jousseaume.

Tellina Mars Hanley. — Grand-Bassam. — Une seule valve droite représente cette espèce, qui a une forme oblongue (55×27 mm.) assez comprimée, presque équilatérale, à côté antérieur arrondi, à côté postérieur flexueux, subrostré et obtusément acuminé, une couleur rose et une sculpture consistant en stries concentriques très serrées et en lignes radiales obsolètes.

C'est une Coquille rare qui manquait au Muséum national de Paris : Hanley (1848, *in* Sowerby, *Thes. Conch.*, I, p. 273, pl. LXII, fig. 180) n'en avait vu qu'un seul exemplaire faisant partie de la collection Cuming, où il était indiqué comme provenant de Guinée[1].

Tellina (Homala) hyalina Gmelin. — Plage entre Tabou et San Pedro. — Trois valves droites représentant ce *T. hyalina* Gmelin (1790, *Syst. Nat.*, ed. XIII, p. 3235), qui est l'espèce figurée par Chemnitz (1782, *Conch. Cab.*, VI, p. 107, pl. XI, fig. 99) sous le nom de *Tellina complanata pellucida :* cette Coquille de Guinée est oblongue (75×45 mm.), mince, comprimée, très inéquilatérale, à côté antérieur court et arrondi, à côté postérieur prolongé (deux fois plus long que l'autre), arrondi, atténué, concave près des sommets.

C'est une forme rare : Hanley (1846, *in* Sowerby, *Thes. Conch.*, I, p. 292, pl. LXI, fig. 167) la connaissait seulement par un spécimen que le Dr Bates lui avait envoyé des États-Unis[2]; Römer (1872, *Conch. Cab.*, 2e édit., p. 181, pl. I, fig. 5) ne l'avait rencontrée dans aucune collection d'Allemagne et Bertin (1878, *Nouv. Archiv. Mus. Paris*, 2e s., I, p. 294) signale également son absence au Muséum national de Paris.

Römer donne comme étant synonyme, d'après Schröter, le *T. excavata* Spengler. Or, en réalité, Schröter (1786, *Einleit. Conchyl.*, III, p. 6) cite deux formes différentes : l'une des côtes de Guinée, n° 13, qui est l'espèce de Chemnitz; l'autre des Indes orientales, n° 14, qu'il considère comme une variété et qu'il nomme *T. excavata* Spglr. Mais ce *T. excavata* a été identifié par Mörch (1870, *Malak. Blätt.*, XVII, p. 117) au *Tellina sinuata* Spengler (1798, *Skrivt. Naturh. Selsk.*, IV, Hft. 2, p. 40, pl. XII, fig. 6), de Tranquebar, qui appartient au sous-genre *Tellinides*.

D'autre part, L. Pfeiffer (1840, *Krit. Reg. Conch. Cab.*, p. 64) indique, avec point d'interrogation, comme synonyme de *T. hyalina* Gm. le *Psam-*

(1) Reeve (1867, *Conch. Icon.*, pl. XXXVI, fig. 204) a fait confusion et cite pour habitat la Nouvelle-Guinée.

(2) Reeve (1867, *Conch. Icon.*, pl. XXXVIII, fig. 216) en a conclu que cette espèce avait les Etats-Unis comme habitat.

motœa candida Lk., mais celui-ci est un *Macoma* Australien, qui, d'après Bertin (1878, *loc. cit.*, p. 342 et 344), est la forme figurée par la plupart des auteurs [Hanley, Reeve, Römer] sous le nom erroné de *Tellina galathea* Lk. et chez lequel, au contraire, c'est le côté antérieur qui est allongé et arrondi, le côté postérieur étant court et tronqué.

Tellina (Metis) lacunosa Chemnitz. — Tabou, San Pedro, Grand-Bassam. — Sous l'appellation de *Metis lacunosa* trois espèces ont été confondues (1918, Lamy, *Bull. Mus. Paris*, XXIV, p. 168) :

1° Une espèce de la Floride et des Antilles : le *T. ephippium* Spengler = *T. intastriata* Say [probablement faute d'impression pour *interstriata*] = *T. Grüneri* Philippi = *T. inornata* Adams;

2° Une espèce de la Mer Rouge et des Mers de Chine : le *T. coarctata* Philippi = *T. lacunosa* auct. [Hanley, Sowerby, Römer] (*non* Chemnitz);

3° Une espèce de Guinée et du Sénégal : le véritable *T. lacunosa* Chemnitz (1782, *Conch. Cab.*, VI, p. 92, pl. 9, fig. 78), figuré dans l'*Encyclopédie Méthodique* sous le n° 1 de la planche 231, en haut de laquelle Bruguière a inscrit le nom générique de *Capsa*, qui, pris dans cette acception, est synonyme de *Metis* H. et A. Adams.

Tellina (Macoma) cumana O. G. Costa. — Grand-Bassam, Assinie.